

JE PARTICIPE À LA SÉCURITÉ DE MA DIALYSE



LA SÉCURITÉ EST L'AFFAIRE DE TOUS.

En signalant rapidement tout changement de mon état de santé, je contribue à la qualité et à la sécurité de ma prise en charge.

Je contribue à ma sécurité en ...



SIGNALANT

tout changement de mon état de santé.



INFORMANT

l'équipe de tout nouveau traitement ou de toute hospitalisation.



SURVEILLANT

quotidiennement ma fistule ou mon cathéter.



POSANT

toutes les questions qui me semblent utiles.



PARTAGEANT

mes inquiétudes ou mes difficultés avec les professionnels.



ENSEMBLE, PATIENTS, PROCHES ET PROFESSIONNELS
sont partenaires de la qualité et de la sécurité des soins.

DEPUIS MA DERNIÈRE SÉANCE DE DIALYSE

ai-je présenté ?



Une fièvre, des frissons ou des signes d'infection.

Ils peuvent nécessiter une prise en charge rapide et modifier l'organisation de la séance.



Une douleur, une rougeur, un gonflement ou un écoulement au niveau de ma fistule ou de mon cathéter.

Ces signes peuvent traduire une infection ou un dysfonctionnement de l'abord vasculaire.



Une modification inhabituelle de ma fistule (absence de vibration, douleur, difficulté de ponction...).

La préservation de la fistule est essentielle à la poursuite de la dialyse dans de bonnes conditions.



Un essoufflement inhabituel, une douleur thoracique ou des palpitations.

Ils peuvent révéler un problème cardiovasculaire ou un excès d'eau et de sel.



Une prise de poids importante entre deux séances.

Elle peut conduire à adapter votre séance de dialyse.



Un gonflement important des jambes, des chevilles ou du visage.

Peut-être le signe d'un excès d'eau et de sel.



Des nausées, vomissements ou diarrhée importants.

Ils peuvent entraîner une déshydratation ou des déséquilibres biologiques, et peuvent être le signe d'un problème qui nécessite une consultation médicale urgente.



Une chute, un traumatisme ou un malaise.

Ces événements peuvent nécessiter une adaptation de votre prise en charge.



Un nouveau médicament, un arrêt ou une modification de traitement.

Certaines modifications peuvent avoir un impact sur votre état de santé ou votre séance de dialyse.



Une consultation aux urgences ou une hospitalisation.

L'équipe doit connaître les soins reçus et les examens réalisés, ainsi que les éventuels changements de traitement.



Un saignement inhabituel ou de nombreux bleus.

Ils peuvent nécessiter de modifier le déroulement de votre séance de dialyse, et/ou de faire une prise de sang.



Une maladie contagieuse (COVID-19, grippe, gastro-entérite...) ou un contact avec une personne malade.

Cette information permet de protéger les autres patients et les professionnels.